

Informacja o produkcie PEDICETAMOL®

Pedicetamol®, paracetamol 100 mg/ml, roztwór doustny

1 ml roztworu doustnego zawiera 100 mg paracetamolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Azorubina (karmioizyna) (E-122) 0,050 mg/ml.

Wskazania do stosowania: leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Dawkowanie i sposób podawania: podanie doustne. Pedicetamol® jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 10 lat). Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego. Zalecana dawka dobową paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana jest w 4 dawkach (15 mg/kg mc.) na dobę co 6 godzin. Gdy przy dawkowaniu co 6 godzin pożądane działanie nie zostanie osiągnięte po 3–4 godzinach, lek można podawać co 4 godziny w 6 dawkach (10 mg/kg mc.) na dobę.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na paracetamol.