

Succus Echinaceae Phytopharm, 2,425 g/2,5 ml, płyn doustny. **Skład jakościowy i ilościowy:**

W 100 ml płynu znajduje się 100 ml soku ze świeżego ziela jeżówki purpurowej (*Echinacea purpurea* L, herba), stabilizowanego etanolem (*Echinaceae purpureae herbae recentis succus* (1:1)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V), woda. Zawartość etanolu w produkcie 20-30% (V/V). **Postać farmaceutyczna:** Płyn doustny. **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Tradycyjnie stosuje się: wspomagająco w przeziębieniach i do krótkotrwałego zastosowania profilaktycznego, w celu zmniejszenia podatności na przeziębienia w okresach wzmożonych zachorowań. Succus Echinaceae Phytopharm jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie i sposób podawania: Podanie doustne. Zaleca się następujący schemat stosowania leku: dorośli 3-4 razy na dobę po 2,5 ml, młodzież w wieku powyżej 12 lat – 1 ml 3 razy na dobę. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania. Lek przyjmować codziennie przez 10 dni. Powtórzenie kuracji po konsultacji z lekarzem. Leczenie najlepiej rozpocząć po pojawieniu się pierwszych objawów przeziębienia. **Przeciwwskazania:** Nie zaleca się stosowania produktu: w przypadku postępujących chorób układowych (np. gruźlica, sarkoidoza, kolagenozy, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych schorzeniach o charakterze autoimmunologicznym i z autoagresji; w onkologii w przypadku terapii cytostatykami; u osób po transplantacji szpiku lub innych organów; w zaburzeniach układu hematologicznego, dotyczących białych krwinek (np. agranulocytoza, leukemia); w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma); w przypadku uczulenia na substancję czynną lub rośliny z rodziny astrowatych, dawniej złożonych

(*Asteraceae/Compositae*). **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

U pacjentów z atopią istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. Ten lek zawiera 244 mg alkoholu (etanolu) w dawce 1 ml oraz 609 mg alkoholu (etanolu) w dawce 2,5 ml. Ilość alkoholu w 1 ml tego leku jest równoważna mniej niż 7 ml piwa lub 3 ml wina. Ilość alkoholu w 2,5 ml tego leku jest równoważna mniej niż 16 ml piwa lub 7 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. **Działania**

niepożądane: Mogą wystąpić przypadki nadwrażliwości na preparaty z jeżówki, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, zespołem Stevens-Johnson'a, obrzękiem naczynioruchowym (angioedema) skóry, obrzękiem Quinckego, skurczem oskrzeli z obturacją, astmą i reakcją anafilaksji. Lek może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią. Stwierdzono także związek z chorobami autoimmunologicznymi (stwardnienie rozsiane, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evans'a, zespół Sjögren'a z kanalikową niewydolnością nerek). W wyniku długiego stosowania (powyżej 8 tygodni) może wystąpić leukopenia.

Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Kłęka S.A., Kłęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska. **Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLW MiPB nr:** R/0628. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.