

Cynacholin, 4,88 g/5 ml, płyn doustny. **Skład jakościowy i ilościowy:** W 100 ml płynu doustnego znajduje się 100 ml (co odpowiada 97,5 g) wyciągu gęstego z *Cynara scolymus* L., ziele karczocha - *Cynarae herbae extractum spissum* (2 – 4 : 1), substancja pomocnicza dodawana do wyciągu: etanol 96% (V/V). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda. Zawartość etanolu w produkcie: 40 - 50% (V/V). **Postać farmaceutyczna:** Płyn doustny. **Wskazania do stosowania:** Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami i uczuciem pełności w jamie brzusznej. Cynacholin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. **Dawkowanie i sposób podawania:** Produkt jest przeznaczony do stosowania doustnego. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: W niestrawności przyjmować doustnie 2 - 3 razy dziennie po 2,5 ml leku rozcieńczonego niewielką ilością płynu, najlepiej wody. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania. **Przeciwwskazania:** uczulenie na karczochy lub inne rośliny z rodziny astrowatych (*Asteraceae*), dawniej złożonych (*Compositae*), np. arnikę, rumianek, jeżówkę; nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu; w zapaleniu dróg żółciowych; w przypadku kamieni żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych; w zapaleniu wątroby. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:** Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera ok. 0,9 g etanolu, co stanowi odpowiednik ok. 9 ml wina i ok. 22 ml piwa. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży, karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grupy wysokiego ryzyka tj. u pacjentów z chorobami wątroby lub z padaczką. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej. **Działania niepożądane:** Mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka, bóle skurczowe brzucha, zgaga) i reakcje alergiczne. Częstość występowania nie jest znana. **Podmiot odpowiedzialny:** Phytopharm Kłeka S.A., Kłeka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska. **Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLW MiPB nr:** R/2167. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.