

Literatura:

1. Charakterystyka produktu leczniczego Allergodil krople do oczu 0,5 mg/ml; 06.2025
2. Charakterystyka produktu leczniczego Allergodil aerozol do nosa 1 mg/ml; 06.2025

Skrócona informacja o lekach Allergodil

Allergodil (*Azelastini hydrochloridum*), 0,5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodoru oraz subst. pomoc. 0,125 mg chlorku benzalkoniowego

Wskazania do stosowania: leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci > 4 lat; leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci > 12 lat.

Dawkowanie i sposób podawania: Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek: dorośli i dzieci >4 lat zazwyczaj 1 kropla leku do każdego oka 2 razy/dobę, w razie konieczności zwiększyć dawkę do 1 kropli podawanej 4 razy/dobę. Lek można podać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen. Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek: dorośli i dzieci >12 lat zazwyczaj 1 kropla leku do każdego oka 2 razy/dobę, w razie konieczności zwiększyć dawkę do 1 kropli podawanej 4 razy/dobę. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowanego leku podczas leczenia trwającego maks. 6 tygodni, dlatego 1 cykl leczenia produktem należy ograniczyć do 6 tygodni.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorowodorek azelastyny lub na którąkolwiek subst. pomoc.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: nie jest wskazany w leczeniu zakażeń oczu; Zawartość chlorku benzalkoniowego: lek zawiera chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący powszechnie stosowany w preparatach okulistycznych, który może powodować punktikowe zapalenie rogówki i/lub toksyczne wrzodziejące zapalenie rogówki. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 15 min. przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Należy zachować ostrożność stosując lek podczas ciąży; niewielkie ilości azelastyny przenikają do mleka kobiecego i dlatego nie zaleca się stos. u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane: bardzo rzadko: odczyny alergiczne; niezbyt często: gorzki smak w ustach; często: podrażnienie oczu*

* z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi.

Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci.

Pozwolenie nr: 10626 wydane przez Prezesa URPL

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC

Allergodil (*Azelastini hydrochloridum*), 1 mg/ml (0,1%), aerozol do nosa, roztwór

Skład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg azelastyny chlorowodoru

Wskazania do stosowania: leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny); leczenie objawowe nie sezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa

Dawkowanie i sposób podawania: podawać za pomocą aplikatora, trzymając głowę w pozycji pionowej. Zwykle stosuje się po 1 dawce do każdego otworu nosowego, 2 razy/dobę (co odpowiada 0,56 mg chlorowodoru azelastyny/dobę). Lek może być stos. aż do ustąpienia objawów. Najdłuższy okres obserwacji u osób dorosłych, u których stosowano chlorowodorek azelastyny w postaci aerozolu do nosa w badaniu klinicznym wynosi 12 miesięcy, a u dzieci 6 miesięcy.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorowodorek azelastyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stos. u dzieci < 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: produkt zawiera disodu edetynian, mogący wywołać reakcje alergiczne u pacjentów nadwrażliwych

Działania niepożądane: bardzo rzadko: nadwrażliwość, zawroty głowy; zmęczenie, wyczerpanie, osłabienie; wysypka, świąd, pokrzywka; rzadko: nudności; niezbyt często: podrażnienie zmienionych zapalnie błon śluzowych nosa z objawami takimi, jak: uczucie mrowienia, pieczenia, swędzenie, kichanie, krwawienie z nosa; często: uczucie gorzkiego smaku w jamie ustnej (często spowodowane niewłaściwą pozycją podczas podania aerozolu, np. głowa odchylona do tyłu; rzadko może powodować nudności)

Pozwolenie nr: 7602 wydane przez Prezesa URPL

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC

Podmiot odpowiedzialny: Cooper Consumer Health B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112AX Diemen, Holandia

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 06/2025. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.