

Instrukcja używania wyrobów medycznych Doppelherz med Na zgagę i refluks, Doppelherz med Na Zaparcia i wzdęcia, Doppelherz med Na drażliwe jelita

Doppelherz med Na zgagę i refluks to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym, oparty na alginianie sodu, wodorowęglanie sodu, węglanie sodu, węglanie wapnia i hialuronianie sodu, opracowany w celu wykonywania 3 synergicznych działań: blokuje kwaśny refluks, zmniejsza zgagę i chroni błonę śluzową przełyku.

Doppelherz med Na zgagę i refluks jest wskazany do leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego w celu zmniejszenia związanych z nim objawów, takich jak zgaga, zgaga w okresie ciąży, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, zaburzenia trawienia, nocne objawy refluksu, kaszel, zapalenie krtani i gardła.

Sposób użycia: Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 r.ż.: 1 lub 2 saszetki po głównych posiłkach i przed snem. Wstrząsnąć przed użyciem. Dzieci w wieku poniżej 12 r.ż.: podawać wyłącznie po zasięgnięciu porady lekarza. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza co do sposobu przyjmowania produktu.

Składniki: Woda oczyszczona, alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu, węglan wapnia, aromat, kwas poliakrylowy, hialuronian sodu, metylu parahydroksybenzoesan sodu, sacharynian sodu, etyloparaben.

Działanie: Doppelherz med Na zgagę i refluks zawiera w składzie alginian sodu oraz węglany i działa dzięki fizycznemu mechanizmowi działania. W kontakcie z kwaśnym pH żołądka, alginian sodu (naturalny polimer pozyskiwany z alg brunatnych) reaguje tworząc żel, natomiast węglany uwalniają dwutlenek węgla, umożliwiając unoszenie się żelu na powierzchnię treści żołądka, a tym samym tworzenie bariery, która mechanicznie zapobiega przedostawaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku. Ponadto obecność wodorowęglanu przyczynia się do zmniejszenia kwasowości w żołądku. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, produkt chroni błonę śluzową przełyku przed agresywnym działaniem kwasów, tworząc barierę ochronną. Sprzyja to regeneracji i wspomaga zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Formuła, charakteryzująca się specyficzną równowagą pomiędzy alginianem sodu a węglanami, sprzyja szybkiemu działaniu. Produkt zawiera hialuronian sodu, mukopolisacharyd o właściwościach nawilżających i powlekających, który wspiera ochronę błony śluzowej przełyku.

Ostrzeżenia: Stosowanie u dzieci musi odbywać się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. W okresie ciąży i karmienia piersią, przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować tego produktu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Opakowanie: 20 saszetek do bezpośredniego spożycia.

Podmiot prowadzący reklamę: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.; **Producent:** Biofarma Włochy

Doppelherz® Med Na zaparcia i wzdęcia to wyrób medyczny o podwójnym działaniu, przeznaczony do objawowego leczenia zaparć oraz łagodzenia wzdęć. Wspiera naturalną perystaltykę jelit, ułatwia oczyszczanie jelit i pomaga zapobiegać tworzeniu się twardych, zbitych mas kałowych.

Doppelherz® Med Na zaparcia i wzdęcia działa fizycznie dzięki połączeniu makrogolu i symetykonu. Makrogol wiąże wodę w świetle jelita, zatrzymując ją w stolcu. Dzięki temu nawadnia i zmiękcza masy kałowe, ułatwia ich przesuwanie oraz wydalanie. Pobudza perystaltykę jelit i przyspiesza pasaż jelitowy. Substancja ta nie jest wchłaniana ani metabolizowana w przewodzie pokarmowym i, stosowana zgodnie z zaleceniami, nie powoduje zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Symetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w przewodzie pokarmowym, co ułatwia ich łączenie i usuwanie. Dzięki temu redukuje wzdęcia, uczucie rozdęcia oraz dyskomfort brzucha. Działanie produktu pojawia się zwykle w ciągu 24–72 godzin od zastosowania.

Sposób użycia Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 r.ż.: 1 do 4 saszetek z płynem dziennie. Dawkę należy zwiększać lub zmniejszać w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie, aby umożliwić regularne wydalanie miękkich stolców. Maksymalna dawka zwykle nie przekracza 4 saszetek z płynem na dobę. Roztwór doustny należy przyjmować w niezmienionej postaci. Natychmiast po zażyciu produktu należy wypić około 125 ml wody, na każdą przyjętą saszetkę. W przypadku stosowania dawki minimalnej (1 saszetka z płynem dziennie), zaleca się przyjmowanie produktu rano. W przypadku większych dawek należy je rozdzielić na przyjmowane rano i wieczorem. Jeżeli po 7 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.

Składniki Woda oczyszczona, makrogol, kwas poliakrylowy, symetykon, kwas cytrynowy, aromat cytrusowy, sorbinian potasu, benzoetan sodu, sukraloza.

Ważne wskazówki Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (ból brzucha, wzdęcia, rozdęcie brzucha, nudności, nietrzymanie stolca). Biegunka jest konsekwencją zbyt wysokich dawek produktu Doppelherz® med Na zaparcia i wzdęcia i można jej uniknąć poprzez zmniejszenie dawki. W rzadkich przypadkach zgłaszano reakcje nadwrażliwości (wysypkę skórą) w wyniku stosowania produktów zawierających makrogol. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie produktu i zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia Stosowanie u dzieci musi odbywać się pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. W okresie ciąży i karmienia piersią, przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować tego produktu po upływie terminu ważności podanego na

opakowaniu. Nie stosować, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Produkt może skracać czas pasażu jelitowego i tym samym zmniejszać wchłanianie leków stosowanych doustnie. Dlatego w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków doustnych zaleca się zasięgnąć porady lekarza. W każdym razie należy je przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin. Produkt może powodować potencjalne interakcje, jeśli jest stosowany ze środkami zagęszczającymi do żywności na bazie skrobi. Makrogol przeciwdziała efektowi zagęszczającemu skrobi, rozrzedzając preparaty, które powinny zachować gęstość dla osób z zaburzeniami połykania. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie produktu i zasięgnąć porady lekarza.

Opakowanie: 10 saszetek

Podmiot prowadzący reklamę: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.,; **Producent:** Biofarma Włochy

Doppelherz med Na drażliwe jelita to wyrób medyczny stosowany w leczeniu zespołu jelita drażliwego (Irritable Bowel Syndrome - IBS). Opakowanie 30 tabletek **Wskazania:** Wyrób medyczny wskazany do leczenia zespołu jelita drażliwego, charakteryzującego się bólem, obrzękiem, wzdęciami i dyskomfortem w jamie brzusznej, związanymi lub nie ze zmianą wyglądu stolca oraz z zaburzeniami rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki lub ich naprzemienne występowanie). **Doppelherz med Na drażliwe jelita** poprzez mechaniczne działanie ochronne, fizycznie współdziała z błoną śluzową jelit, tworząc mukoadhezyjny film, który chroni błonę śluzową przed kontaktem z substancjami drażniącymi, a jednocześnie pomaga usunąć niebezpieczne substancje zapobiegając ich wchłanianiu. Poprzez mechanizm typu fizycznego pomaga absorbować gazy jelitowe, zmniejszając w ten sposób typowe dolegliwości zespołu jelita drażliwego.

Skład: zeolit (klinoptylolit), wyciąg z rumianku pospolitego (*Matricaria chamomilla* L.), wyciąg z prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), aloes (*Aloe vera* L., sok z żelu 200:1, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tyndalizowane bakterie *Lactobacillus plantarum*, celuloza, fosforany wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, olejek eteryczny z kopru włoskiego (*Foeniculum vulgare* Mill.), olejek eteryczny z kminku zwyczajnego (*Carum carvi* L.).

Dawkowanie i sposób postępowania z wyrobem: Zalecana dawka to 1 tabletkę 2 razy dziennie. Tabletki powinny być przyjmowane przed jedzeniem lub pomiędzy posiłkami lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku ostrego bólu dawkę można podwoić. W zależności od nasilenia choroby, zaleca się przedłużyć stosowanie z 2 do 6 tygodni i powtarzać leczenie w przypadku ponownego pojawienia się objawów.

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomimo, iż nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania wyrobu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia. W każdym przypadku, należy skonsultować się z

lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego wyrobu medycznego. Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki dziennie. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do wyrobu w nienaruszonym opakowaniu, prawidłowo przechowywanym.

Warunki przechowywania: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C w suchym, chłodnym miejscu, chronić od światła.

Podmiot prowadzący reklamę: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.

Producent: Labomar Sp. a.